Az Effektív Mikroorganizmusok (emBIO Herbs) nyújtotta előnyök a sertéstartásban

Az emBIO Herbs használatának előnyei a sertéstenyésztésben:

- a kellemetlen szagok megszűnése,
- gyenge szagintenzitású, magas tápértékű trágya képződik,
- gyorsabb súlynövekedés
- egészségesebb állatok,
- stresszhatás csökken,
- kevesebb gyógyszerre van szükség,
- ízletesebb, jobb minőségű hús

A sertéstartás állandó problémája az erős szagú ürülék. A felszabaduló ammónia nem csak az állati, hanem az emberi légutakat is terheli, károsítja. Az emBIO Herbs megfelelő alkalmazásával a szaghatás jelentősen redukálható, a gázok okozta stresszhelyzet megszűnik és a légutak terhelése csökken. Ezen kívül hasznos melléktermékként gyenge szagintenzitású, magas tápanyagtartalmú trágyát, illetve hígtrágyát kapunk.
A tápanyagok jobb felhasználása gyorsabb tömegnövekedést eredményez. Az emBIO Herbs antioxidatív és betegségelnyomó hatása révén kiválthatja a féregtelenítőket és az antibiotikumokat, a rájuk jellemző stressz hatás okozása nélkül.

Alkalmazás:

Az ólak előkészítése:
A szaghatás csökkentése céljából magasnyomású tisztítóval és 1 liter / 10m^2 1:4 hígítású (0,2liter emBIO Herbs + 0,8liter víz) emBIO Herbs oldattal alaposan tisztítsuk ki az ólakat, ügyelve, hogy az egész területet lefedjük – a szellőzőnyílásokat és a tető repedéseit sem kihagyva.

Ködképzés az ólakban:

1. hónapban: összesen 3-4 alkalommal hetente, (legkedvezőbb az időkapcsolóval irányított, rögzített párásító szelepek használatával) később: heti 1-2 alkalommal juttassunk ki az ólakba az alábbi keveréket:
Meleg évszakokban: 1 liter / 10m^2 mennyiségű, 1:4 arányú emBIO Herbs oldatot (0,2 liter emBIO Herbs + 0, 8 liter víz) kijuttatása szükséges.
Hideg évszakokban: 1 liter / 10m^2 mennyiségű, 1:9 arányú emBIO Herbs oldatot (0,1 liter emBIO Herbs + 0,9 liter víz) kijuttatása szükséges.

Hűtőpanel esetében: 1:1000 arányban (1 liter emBIO Herbs, 1000 liter vízhez) kell alkalmazni.

A trágya és a hígtrágya kezelése:
1-2 liter / m^3 emBIO Herbs oldatot jutassunk ki az anyagra (az összetevők arányától függően), a legjobb azonban heti 1 alkalommal a szennyvízelvezetőn át, ill. egyenesen a trágyára adagolni. Javasolt lúgos-szilikátos kőliszt hozzáadása, lehetőleg nagy felületen elosztva. Ennek adagolása: 3 kg/m^3.

Az emBIO Herbs használata a sertéstakarmányozásban

Tenyészkocáknál

<u>Adagolási mennyiség:</u>

Száraztakarmány
1-3. hónapban: 7-10 liter emBIO Herbs / tonna mennyiséget keverjünk a takarmányba,
később: 5-7 liter emBIO Herbs / tonna adagra csökkentsük a mennyiséget
Az emBIO Herbs antioxidáns hatásának köszönhetően a ledarált gabona stabil marad.

Folyékony takarmány
1-3. hónapban: 2-3 liter emBIO Herbs / tonna mennyiséget keverjünk a folyékony takarmányba
később: 1-2 liter emBIO Herbs / tonna mennyiségre csökkentsük az adalékot.

Serkentő takarmányozás: 1000 literenként 2 liter emBIO Herbs hozzáadásával előállítható a folyékony takarmány.

Stresszhelyzetben
A fenti adagolást kiegészítve az ellés előtt 5 nappal és az ellés után 12 nappal még $^1/_8$ liter emBIO Herbs / koca / etetés.

Malacoknál

<u>Adagolási mennyiség:</u>

Száraztakarmányba keverve
7-10 liter emBIO Herbs / tonna mennyiséget keverjünk a takarmányba, az adagolás végén 5-7 liter emBIO Herbs / tonnára csökkentsük az adagot.

Folyékony takarmányba keverve
2-3 liter emBIO Herbs-tt keverjünk a folyékony takarmányba, a fázis végén 1-2 liter emBIO Herbs / tonna mennyiségre csökkentsük az adagot.

Stresszhelyzetben
A fenti adagolást kiegészítve az ellés után közvetlenül kb. 2 ml emBIO Herbs-t szájon keresztül, majd a vasadagolás során kb. 3 ml-t adagoljunk szájon át az állatoknak.
A elválasztási időszakban 10% emBIO Herbs Bokashi-t keverjünk a táphoz, melyet minden nap frissen készítsük el.

Hízóknál

<u>Adagolási mennyiség:</u>

Száraztakarmányba keverve
7-10 lliter emBIO Herbs / tonna mennyiséget keverjünk a takarmányba, majd, a fázis végén 5-7 liter emBIO Herbs / tonnára csökkentsük az adagot.

Folyékony takarmányba keverve
2-3 liter emBIO Herbs-t keverjünk a folyékony takarmányba, végül 1-2 liter emBIO Herbs / tonna mennyiségre csökkentsük az adagot.

Stresszhelyzetben
Kiegészítve a fenti adagolást: folyékony takarmánynál 5 liter emBIO Herbs-t, ill. száraztakarmánynál 2-3% emBIO Herbs Bokashi-t adjunk hozzá.

Felhasználás
A tápanyagban való tökéletes elosztás érdekében az emBIO Herbs-t keverjük össze egy kevés búzakorpával.

Forgalmazó:
Pro Primo 2000 Bt.
3300 Eger, Cecey u. 22.
(20) 253 1706
www.okoeffekt.hu
okoeffekt@gmail.com